

Ripening™ **K**

Beklentilerinize Hızlı ve Etkili Çözüm!

Ripening-K

Ürünlerinizin erken olgunlaşmasını ve BRIX değerinin maksimum seviyeye çıkmasını sağlayarak tarımsal gücünüze güç katacak eşsiz bir üründür.



Bitkilerinize Klor (Cl) içermeyen yüksek konsantreli potasyum desteği sunar.



Turgor basıncını düzenleyerek bitkilerinizin su kaybını minimum seviyeye indirir.



Meyve sertliği ve depolama ömrünü uzatır.



Yaprak ve meyvede leke riski yaratmaz.



İÇERİK

Potasyum (K₂O): %25










Ripening™ K

Ripening-K Erken olgunlaşmaya ulaşmak ve BRIX değerini arttırmak için tasarlanmış eşsiz bir üründür. Sahip olduğu yüksek konsantrasyonlu potasyum turgor basıncını düzenler, bitkilerinizin su kaybına engel olur. Ksilem iletim boruları içerisinde su ve besin elementlerinin hızlı ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlayarak verim ve kalite artışı sağlar. Güçlü bir bitki dokusu oluşturarak ürünlerde raf ömürlerinin artmasına neden olurken depolama sırasında oluşan ağırlık kaybının azalmasını sağlayarak kaliteyi artırır. Bitkilerinizin üretim döngüsünün tam olarak etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak tarımsal gücünüze güç katar.

- ✓ Erken olgunlaşma ve BRIX değerini artırır.
- ✓ Bitki tarafından kolay ve hızlıca absorbe edilir.
- ✓ Tuz içermez ve pülverizatör memelerinde tıkanmaya neden olmaz.
- ✓ Hızlı ve daha uzun süreli etki.



UYGULAMA DOZLARI

Bitki	Dozu	Uygulama Şekli ve Dönemi
 Meyve Ağaçları	100-250 ml/100 lt su	Meyvelerin büyümeye başlaması ile hasattan 2 hafta öncesine kadar 15 gün ara ile uygulama yapılır.
 Sebzeler (Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Havuç vs.)	100-250 ml/da	Tam yapraklanmadan sonra 3-5 uygulama.
 Narenciye	100-250 ml/100 lt su	Meyve oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.
 Bağ	100-250 ml/100 lt su	Dane tutumundan sonra 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama. Daneler olgunlaşınca 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama
 Çilek	100-250 ml/da	Çiçeklenme döneminde 10-15 gün ara ile tekrarlanır.
 Zeytin	100-250 ml/100 lt su	Meyvelerin büyümeye başlaması ile hasattan 2 hafta öncesine kadar 15 gün ara ile uygulama yapılır.
 Mısır, Ayçiçeği	100-250 ml/da	Ekimden 4-5 hafta sonrası ile hasat arasında uygulanır.
 Pamuk	100-250 ml/da	Çiçeklenme döneminde uygulanır.
 Tarla ve Endüstri Bitkileri (Yer Fıstığı, Soya Fasulyesi, Şeker Pancarı, Tütün vs.)	100-250 ml/da	Tam yapraklanmadan sonra 3-5 uygulama.
 Süs Bitkileri	100-200 ml/100 lt su	Çiçeklenme öncesi dönemde 10-15 gün ara ile tekrarlanır.