

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU
Domates (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>)	400 ml/ 100 L su
Çilek (sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea Pers. Fr</i>)	400 ml/ 100 L su
Biber (sera)	Toprak Kökenli Patojenler (<i>Fusarium spp.</i>)	500 ml / da (damlama sulama)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Kurşuni küf, Sera veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Çilek Kurşuni küf: 1. İlaçlama : İlk çiçeklerin %10'u açtığı dönemde,

2. İlaçlama : Çiçeklerin %50'si açtığı dönemde,

3. İlaçlama : İlk yeşil meyvenin görüldüğü dönemde,

4. İlaçlama: Uygulama ve hasat arasında geçmesi gereken dönem dikkate alınarak hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.

Biber Toprak kökenli patojenler

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra, fide kök yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şartılmasından sonra yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FUNGISEI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F6:44 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FUNGISEI**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F6:44 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım denemesi tavsiye edilir.



FUNGISEI

SUDA ÇÖZÜNEBİLİR KONSANTRE (SL)

GRUP	F6:44	Biyolojik Fungisit
------	-------	--------------------

Bacillus Subtilis 1AB/BS03 (1 x 10⁷ cfu/ml)

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.

Soluması halinde: Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürünüz. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Göz ile teması halinde: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Bilinen bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

İÇİNDEKİLER	<i>Bacillus Subtilis</i>
-------------	--------------------------

ZARARLILIK İŞARETLERİ

UYARI KELİMESİ

ÖNLEM İFADELERİ

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.
-P501 İçerikleri/kabı yerel yetenmeliklere uygun olarak atınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Balıklara zehirlidir.
*Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
*Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız. Ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden ve bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ile imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA:

SEIPASA S.A
C/A Almudevar, 222240 No:2
Tardienta (Huesca)/ İSPANYA

ÜRETİM TESİSİ:

SEIPASA S.A
C/Ciudad Darío, naves 1-3-5i L⁷
Alcudia (Valencia) İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ:

ADAGRO ZİRAİ İLAÇ HAYVANCILIK TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KARACAOĞLAN MAH. 6157/3 SK. NO:2/C İŞIKKENT – BORNOVA/İZMİR
TEL: (232) 478 02 45
FAX: (232) 478 02 46
www.adagro.com.tr

ADAGRO ZİRAİ İLAÇ HAYVANCILIK
TARIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Karacaoğlan Mahallesi 6157/3 Sokak No:2/C

Hesap Tutulmuş
Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

08 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Dalre Başkanı

